

## INSTRUCCIONES GENERALES

1. **Triaga un conductor adulto.** Su conductor debe tener 18 años de edad o más y debe permanecer en el Centro de Endoscopia. Se le administrará un sedante para su examen, y no debe conducir hasta el día siguiente. Por lo tanto, una persona debe quedarse y conducirlo a casa. Su procedimiento será reprogramado si su conductor no puede quedarse en el Centro.
2. **Si necesita reprogramar** su procedimiento, llame a la oficina de su médico con al menos 3-4 días de anticipación para que podamos programar a otro paciente en su horario.
3. NOTIFIQUENOS CON ANTICIPACION:
  - Si está tomando un **anticoagulante** recetado por un médico) como Coumadin, Plavix, Effient, Eliquis o Ticlid). Su gastroenterólogo necesitará determinar si las dosis de estos medicamentos requieren ajuste antes del procedimiento. No ajustar estos medicamentos adecuadamente puede resultar en la cancelación de su procedimiento. Puede continuar tomando Aspirina como de costumbre.
  - Si está teniendo dolor **en e; pecho o se está sometiendo a pruebas cardiacas**. (IMPORTANTE: Por favor notifíquenos antes de comenzar a prepararse para su procedimiento.)
  - Si alguna vez ha tenido sangrados **excesivos después de una operación o problemas con la anestesia**.
  - Si existe la posibilidad de que Este **embarazada**.
4. NO HACER:
  - Tomar hierro, pastillas para adelgazar (Phentermine, Adipex o Qsymia) o medicamentos herbales durante siete (7) días antes de su procedimiento. Puede tomar vitaminas.
  - Beba **alcohol** durante 24 horas antes o después de su procedimiento.
  - Usar elementos **como chicles, caramelos duros, caramelo de menta, tabaco sin humo o drogas ilícitas como marihuana** el día de su procedimiento.
5. Si tiene **dentaduras postizas**, es posible que se le pida que las retire para el procedimiento.
6. **Deje sus objetos de valor en casa.** Si tiene **perforaciones corporales**, se le pedirá que las retire antes del procedimiento por su seguridad.
7. Si es **diabético**, no tome su medicación para la diabetes el día de su procedimiento. Lleve su medicación con usted para que pueda tomarla después de su procedimiento.
8. Si tiene **asma**, traiga su inhalador con usted.
9. Tome sus **medicamentos recetados habituales** con no más de dos (2) cucharadas/ una (1) onza de agua hasta tres (3) horas antes de la hora de su cita.

## INFORMACION IMPORTANTE SOBRE MEDICAMENTOS

### **Los siguientes medicamentos deben suspenderse según las instrucciones antes del procedimiento\*\***

Fentermina: Adipex-P, Qsymia y Lomaira (Diarios)- Estos medicamentos deberán suspenderse siete (7) días antes de su procedimiento.

### **GLP-1 Medicamentos**

Todos los medicamentos GLP-1, incluidos los mencionados a continuación, deberán ser suspendidos siete (7) días antes de su procedimiento si esta tomando una dosis semanal, o el mismo día de su procedimiento si esta tomando una dosis diaria.

- Dulaglutida: Trulicity (Semanal)
- Exenatida: Bydureon (Semanal) y Byetta (Diaria)
- Liraglutida: Victoza (Semanal) y Saxenda (Diaria)
- Lixisenatida: Adlyxin y Soliqua (Diaria)
- Semaglutida: Ozempic (Semanal), Wegovy (Semanal) y Rybelsus (Diaria)
- Tirzepatida: Mounjaro (Semanal) y Zepbound (Semanal)

Por favor, llámenos al 901-747-3630 si tiene alguna pregunta o si está teniendo dificultades con la preparación. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

## CLENPIQ Prep

**5 - 7 DIAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO** - Llene su prescripción.

**5 DIAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO** - Si normalmente tiene menos de 2 evacuaciones intestinales por semana, también necesitará comprar una botella de 8.3 oz de MiraLAX. Comience a tomar una dosis de MiraLAX dos veces al día, 5 días antes de su procedimiento. Tome la última dosis de MiraLAX por la mañana el día antes de su procedimiento.

**3 DIAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO** - EVITE frutas y verduras crudas, productos de trigo integral / multi-grano, frijoles, palomitas de maíz y semillas.

**EL DIAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO** - Solo podrá consumir líquidos claros durante todo el día, como agua, café, té, caldo, refrescos, jugo de manzana, Gatorade, Kool-aíd, gelatina, paletas heladas y caramelos duros. No podrá consumir alimentos sólidos. Es importante beber líquidos claros adicionales antes de su preparación para mantener una hidratación adecuada. No beba líquidos que no sean claros, como la leche. No beba líquidos de color rojo o morado.

**EL DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO - ENTRE LAS 15:00 H Y LAS 18:00 H - INICIE LA PREPARACION**

### PASO 1:

- Tome la Primera dosis (5.9oz) de CLENPIQ.
- Beba todo el contenido. Una pajita puede ayudar.

### PASO 2:

- Siga con al menos CINCO (5) vasos de (8 oz) de líquido transparente, tomados a su propio ritmo antes de acostarse.
- **Esfuércese en beber tantos líquidos transparentes como pueda antes, durante y después de la preparación.**



### NOTA:

- Si experimenta náuseas, ralentice la ingesta del preparado y camine hasta que se le alivien las náuseas.
- Utilice toallitas para bebés y/o crema o loción limpiadora Balneol durante la preparación para reducir la irritación.

**EL DIA DEL PROCEDIMIENTO - 4 HORAS ANTES DE SALIR DE CASA PARA SU CITA**

### PASO 1:

- Tome la Segunda dosis (5.9 oz) de CLENPIQ.
- Beba todo el contenido. Una pajita puede ayudar.

### PASO 2:

- Siga con al menos TRES (3) vasos de (8 oz) de líquido transparente, tomados a su propio ritmo antes de acostarse.
- Puede beber líquidos transparentes hasta tres horas antes de la hora de su cita.
- Puede tomar los medicamentos que tenga recetados (excepto los que figuran en el folleto) con agua hasta tres horas antes de la hora de llegada a su cita.
- Durante el día de su procedimiento, no utilice tabaco que no se fuma.
- A partir de tres horas antes de la hora de llegada a su cita, **absolutamente nada por la boca**, incluidos chicles, caramelos y mentas para el aliento.



**Por favor, llámenos al 901-747-3630 si tiene alguna pregunta o si está teniendo dificultades con la preparación. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.**

## Guía Para Diabéticos

### Medicamentos

- Si toma medicamentos orales para su diabetes, NO tome sus pastillas para la diabetes el día anterior a su procedimiento (día de preparación) ni el día de su procedimiento (hasta que el procedimiento esté completo y retome su dieta normal).
- Si usted usa medicamentos inyectables que no son insulina (Byetta, Bydureon, Victoza, Trulicity, Tanzeum, Symlin), no tome el medicamento si su día de inyección es el día anterior a su procedimiento (día de preparación). Puede reanudarlo después de que el procedimiento esté completo.
- Si toma insulina, reduzca su dosis al 50% (la mitad) de su dosis normal el día anterior a su procedimiento y el día de su procedimiento. Puede retomar su dosis normal después del procedimiento cuando vuelva a su dieta normal.
- Si usa una bomba de insulina, contacte a su médico de diabetes para recibir instrucciones. En general, la mayoría de los pacientes deberá reducir su tasa basal al 80% de la tasa normal.

### Dieta

- Su objetivo debería ser consumir entre 45 y 60 gramos de carbohidratos en cada comida. Aunque normalmente puede evitar los azúcares, está bien consumirlos cuando esté en preparación para su colonoscopia, ya que serán la fuente principal de calorías cuando esté en una dieta líquida clara.
- Para meriendas, intente incluir otros líquidos que contengan electrolitos, como el caldo.
- A continuación, se presentan ejemplos de líquidos claros con la cantidad de carbohidratos. Nota: Si experimenta hipoglucemia (<60) durante las 2 horas previas a su procedimiento, puede tomar 3 cucharaditas de refresco o jugo claro para elevar su azúcar. NO debe tomar alimentos sólidos ni líquidos no claros, ya que su procedimiento será cancelado.

| FLUID                               | AMOUNT         | CARBS |
|-------------------------------------|----------------|-------|
| Jugo                                | ½ taza         | 15g   |
| Gelatina                            | ½ taza         | 15g   |
| Refresco                            | 1 lata         | 40g   |
| Paleta helada                       | 1 paleta doble | 15g   |
| Gatorade / Powerade                 | ½ taza         | 15g   |
| Caldo (vegetal/pollo/res)           | cualquiera     | 0g    |
| <i>Bebidas claras con proteínas</i> | cualquiera     | 0g    |